

PIENSO COMPLEMENTO PARA LA LACTANCIA DE LOS TERNEROS

ARRANQUE 1

Leche maternizada destinada a terneros de cebo y terneras de recría

Código producto: 300287

Saco: 25 kg

Productos lácteos	**70%**
Leche desnatada en polvo	**25%**
Proteínas brutas	**22%**
Materias grasas brutas	**18%**

Ventajas

- Probióticos ⇨ regulación de la flora intestinal
- El mejor compromiso calidad / precio
- Aceite de coco ⇨ digestibilidad y aprovechamiento

El alto valor nutricional del ARRANQUE 1 asegura un crecimiento continuo y rápido de los terneros. La utilización de aceite de coco, rico en ácidos grasos cortos directamente asimilables actúa como verdadero estimulador del metabolismo del animal. La incorporación de probióticos facilita la regulación de la flora intestinal para un buen funcionamiento digestivo.

Aditivos por Kg

Vitamina A	25.000 U.I.	**Vitamina B1**	15 mg
Vitamina D3	8000 U.I.	**Vitamina C**	180 mg
Vitamina E	50 mg	**Cobre (Sulfato pentahidratado)**	8,5 mg
Vitamina K3	5 mg	**Antioxidante: BHT**	40 mg

Laboratorios Karizoo, s.a.
Polig. Industrial La Borda - Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48 **Fax** 93 865 46 48 **web:** www.karizoo.com

MODO DE EMPLEO

1. Alimentación en cubo

La preparación se realiza calentando a 60-65℃ la mitad del volumen total de agua necesaria para prepararla leche de los terneros. Pesar la cantidad total de leche y mezclarla bien hasta su total reconstitución, asegurándose que no haya grumos. Después completar con agua fría hasta obtener el volumen deseado, a una temperatura de 40℃ y distribuirlo lo antes posible. Administrar 2 comidas al día a intervalos regulares. Después de la toma, limpiar con agua los cubos y la mezcladora.

2. Alimentación con nodriza automática

Se entiende por concentración la cantidad de polvo contenida en un litro de agua. Debido a la administración a libre disposición los consumos serán superiores a los previstos en la alimentación en cubo. No comparar la cantidad de leche ingerida. Anotar el consumo diario de leche, el cual debe aumentar progresivamente. Se debe controlar toda modificación del ajuste de la concentración o de la temperatura (45℃ en el recipiente de distribución). Hay que verificar y limpiar la máquina cada día.





Laboratorios Karizoo, s.a.
Polig. Industrial La Borda - Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 93 865 41 48 **Fax** 93 865 46 48 **web:** www.karizoo.com